

# 약물 선별 설문조사 (DAST – Korean)

Patient name: \_\_\_\_\_

Date of birth: \_\_\_\_\_

약물 사용은 귀하의 건강과 복용하는 일부 약에 영향을 미칠 수 있습니다. 귀하께 최선의 치료를 제공할 수 있도록 I II

지난 1 년 동안 다음 약물을 사용한 적이 있습니까?

- 필로폰(액체형태, 결정형태)                       코카인
- 대마초(마리화나, 대마초)                       마약제(헤로인, 옥시코돈, 메타돈 등)
- 흡입제(페인트 시너, 분무약제, 접착제)    환각제(LSD, 버섯)
- 신경안정제(발름)                               기타 \_\_\_\_\_

이러한 약물을 얼마나 자주 사용했습니까?  월 1 회 또는 미만    매주    매일 또는 거의 매일

1. 의료상 필요한 경우 이외에 약물을 사용했습니까?	아니오	예
2. 한 번에 두 가지 이상의 약물을 남용합니까?	아니오	예
3. 중단하기를 원할 때 약물 사용을 중단할 수 없습니까?	아니오	예
4. 약물 사용으로 인해 일시적 기억상실 또는 환각을 경험한 적이 있습니까?	아니오	예
5. 약물 사용에 대하여 나쁘다고 생각하거나 죄책감을 느낍니까?	아니오	예
6. 귀하의 약물 사용에 대해 배우자(또는 부모)가 불평한 적이 있습니까?	아니오	예
7. 약물 사용을 이유로 가족을 소홀히 한 적이 있습니까?	아니오	예
8. 약물을 입수하기 위해 불법적인 활동에 참여한 적이 있습니까?	아니오	예
9. 약물 복용을 중단했을 때 금단증상을 경험한 적이 있습니까?	아니오	예
10. 약물 사용으로 인해 의학적 문제(예: 기억상실, 간염, 경련, 출혈)를 겪은 적이 있습니까?	아니오	예

0

1

주사로 약물을 주입한 적이 있습니까?  없음    있음, 지난 90 일 이내    있음, 지난 90 일 이후

약물 남용 치료를 받은 적이 있습니까?  없음    현재 치료 중    과거에 받은 적 있음

I   II   III   IV  
0   1-2   3-5   6+

(For the health professional)

### Scoring and interpreting the DAST:

“Yes” responses receive one point each and are added for a total score. The score correlates with a zone of use that can be circled on the bottom right corner of the page.

Score	Zone of use	Indicated action
0	<b>I – Healthy</b> (no risk of related health problems)	None
<b>1 - 2</b> , plus the following criteria:  No daily use of any substance; no weekly use of drugs other than cannabis; no injection drug use in the past 3 months; not currently in treatment.	<b>II – Risky</b> (risk of health problems related to drug use)	Offer advice on the benefits of abstaining from drug use. Monitor and reassess at next visit. Provide educational materials.
<b>1 - 2</b> (without meeting criteria)		Brief intervention
<b>3 - 5</b>	<b>III – Harmful</b> (risk of health problems related to drug use and a possible mild or moderate substance use disorder)	Brief intervention or Referral to specialized treatment
<b>6+</b>	<b>IV – Severe</b> (risk of health problems related to drug use and a possible moderate or severe substance use disorder)	Referral to specialized treatment

**Brief intervention:** Patient-centered discussion that employs Motivational Interviewing concepts to raise an individual’s awareness of his/her substance use and enhancing his/her motivation towards behavioral change. Brief interventions are typically performed in 3-15 minutes, and should occur in the same session as screening. The recommended behavior change is to abstain from illicit drug use.

Patients with numerous or serious negative consequences from their substance use, or patients with likely dependence who cannot or will not obtain conventional specialized treatment, should receive more numerous and intensive interventions with follow up.

**Referral to specialized treatment:** A proactive process that facilitates access to specialized care for individuals who have been assessed to have substance use dependence. These patients are referred to drug treatment experts for more definitive, in-depth assessment and, if warranted, treatment. The recommended behavior change is to abstain from use and accept the referral.

More resources: [www.sbirthoregon.org](http://www.sbirthoregon.org)