

Контрольный список симптомов

алкоголя

(Alcohol Symptom Checklist – Russian)

Этот контрольный список поможет вам и вашему врачу понять, как алкоголь и другие наркотики могут влиять на ваше здоровье.

Пожалуйста, подумайте о своей жизни за последние 12 месяцев. Затем ответьте на приведенные ниже вопросы и ответьте «да» или «нет» на каждый из них.

За последние 12 месяцев...

	ДА	НЕТ
А. Стало ли употребление того же количества менее эффективным, чем раньше? Или вам пришлось выпить больше, чтобы ощутить желаемый эффект? <i>Пожалуйста, ответьте «да», если один из этих вопросов для вас верен.</i>		
Б. У вас было расстройство желудка или вы вспотели, дрожали или нервничали, когда не пили или пытались похудеть? Вы употребляли алкоголь или принимали что-то, что помогает вам чувствовать себя лучше? <i>Пожалуйста, ответьте «да», если один из этих вопросов для вас верен.</i>		
В. Были ли у вас моменты, когда вы пили больше или дольше, чем хотели?		
Г. Вы хотели сократить потребление или бросить пить, но не смогли?		
Д. Вы проводили много времени, употребляя алкоголь, выпивая или чувствуя похмелье?		
Е. Вы продолжали пить, хотя думали, что это может вызвать физические или психические проблемы или усугубить их?		
Ж. Мешало ли вам употребление алкоголя выполнять свои обязанности на работе, в школе или дома?		
З. Совершали ли вы опасные вещи более одного раза после употребления алкоголя — например, водили машину или управляли механизмами?		
И. Вы употребляли алкоголь, хотя думали, что это может вызвать проблемы в вашей семье или других людях?		
К. Были ли у вас сильные желания или тяга к алкоголю?		
Л. Стали ли вы тратить меньше времени на работу, хобби или общение с другими людьми из-за того, что вы пьете?		
Количество ответов «Да»		

(For the health professional)

Scoring the checklist*

Each “Yes” answer receives a point. Points are added for a total score that reflects the severity of a possible alcohol use disorder. The health professional should assess whether symptoms reoccur. If symptoms reoccur, refer to table below:

Score	Category	Indicated action
0 - 1	Symptoms are not consistent with an alcohol use disorder	Brief education
2 - 3	Symptoms are consistent with mild alcohol use disorder	Brief intervention using motivational interviewing and harm reduction.
4 - 5	Symptoms are consistent with moderate alcohol use disorder	
6+	Symptoms are consistent with severe alcohol use disorder	

Surveys report that most people living with a substance use disorder do not believe they need treatment. The path to accepting treatment for an alcohol use disorder is usually forged over time and begins with the patient reducing harm from their use and improving their quality of life.

The patient may be willing to brainstorm ways to reduce their harm from drinking, which can include stopping drinking; accepting counseling, medications, or participation in a support group; reducing drinking; counting drinks; not using other substances when drinking; substituting less intoxicating beverages; drinking on a full stomach; drinking in safer environments; getting regular health care. The patient may choose not to change their drinking.

Below is a four-step model of performing a brief intervention. More info at www.sbirthoregon.org

Raise the subject

- “Thanks for filling out this form – is it okay if we briefly talk about your alcohol use?”
- “Just so you know, my role is to help you assess the risks so you can make your own decisions. I want to help you improve your quality of life on your own timeline.”
- “What can you tell me about your alcohol use?”

Share information

- Explain any association between the patient’s use and their health complaint, then ask, “Do you think your use has anything to do with your [anxiety, insomnia, STD, etc.]?”
- Share information about alcohol use disorder.
- Ask the patient: “What do you think of this information?”

Enhance motivation

- Ask patient about perceived pros and cons of their use, then summarize what you hear.
- Elicit a goal: “Where do you want to go from here? What’s your goal, or vision?”
- Gauge patient’s readiness/confidence to reach their goal. If using Readiness Ruler: “Why do did you pick that number on a scale of 0-10 instead of ____ [lower number]?”

Identify plan

- If patient is ready, ask: “What steps do you think you can take to reach your goal?”
- Affirm the patient’s readiness/confidence to meet their goal and affirm their plan.
- “Can we schedule an appointment to check in and see how your plan is going? You may want to change your goal or make a new plan.”

* Hallgren KA, Matson TE, Oliver M, Witkiewitz K, Bobb JF, Lee AK, Caldeiro RM, Kivlahan D, Bradley KA. Practical Assessment of Alcohol Use Disorder in Routine Primary Care: Performance of an Alcohol Symptom Checklist. *J Gen Intern Med.* 2022 Jun;37(8):1885-1893. doi: 10.1007/s11606-021-07038-3. Epub 2021 Aug 16. PMID: 34398395; PMCID: PMC9198160.