

Danh sách kiểm tra triệu chứng rượu

Danh sách kiểm tra này sẽ giúp bạn và nhà cung cấp của bạn hiểu rượu và các loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào.

Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn trong 12 tháng qua. Sau đó, xem qua các câu hỏi dưới đây và trả lời "có" hoặc "không" cho từng câu hỏi.

Trong 12 tháng qua. . .

	CÓ	KHÔNG
1. Uống cùng một lượng có ít tác dụng hơn trước đây không? Hay bạn phải uống nhiều hơn để cảm nhận được hiệu quả mà bạn muốn? <i>Vui lòng trả lời "có" nếu một trong hai câu hỏi đúng với bạn.</i>		
2. Bạn có bị đau bụng hoặc đổ mồ hôi, run rẩy hoặc lo lắng khi bạn không uống rượu hoặc khi bạn cố gắng cắt giảm không? Bạn có uống rượu hoặc uống thứ gì đó để giúp bạn cảm thấy tốt hơn không? <i>Vui lòng trả lời "có" nếu một trong hai câu hỏi đúng với bạn.</i>		
3. Bạn có những lúc bạn uống nhiều hơn hoặc lâu hơn bạn muốn không?		
4. Bạn có muốn cắt giảm hoặc ngừng uống rượu, nhưng không thể?		
5. Bạn có dành nhiều thời gian để uống rượu, uống rượu hoặc cảm thấy nôn nao không?		
6. Bạn có tiếp tục uống rượu mặc dù bạn nghĩ rằng nó có thể gây ra các vấn đề về thể chất hoặc tinh thần - hoặc làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn?		
7. Uống rượu có khiến bạn khó theo kịp trách nhiệm của mình ở nơi làm việc, trường học hay ở nhà không?		
8. Bạn có làm những việc nguy hiểm nhiều hơn một lần sau khi uống rượu - như lái xe ô tô hoặc vận hành máy móc?		
9. Bạn có uống rượu mặc dù bạn nghĩ rằng nó có thể gây ra vấn đề với gia đình hoặc người khác không?		
10. Bạn có ham muốn hoặc thèm rượu mạnh mẽ không?		
11. Bạn có dành ít thời gian hơn để làm việc, tận hưởng sở thích hoặc ở bên người khác vì uống rượu của mình không?		
Số lượng câu trả lời "Có"		

Scoring the checklist*

Each “Yes” answer receives a point. Points are added for a total score that reflects the severity of a possible alcohol use disorder. The health professional should assess whether symptoms reoccur. If symptoms reoccur, refer to table below:

Score	Category	Indicated action
0 - 1	Symptoms are not consistent with an alcohol use disorder	Brief education
2 - 3	Symptoms are consistent with mild alcohol use disorder	Brief intervention using motivational interviewing and harm reduction.
4 - 5	Symptoms are consistent with moderate alcohol use disorder	
6+	Symptoms are consistent with severe alcohol use disorder	

Surveys report that most people living with a substance use disorder do not believe they need treatment. The path to accepting treatment for an alcohol use disorder is usually forged over time and begins with the patient reducing harm from their use and improving their quality of life.

The patient may be willing to brainstorm ways to reduce their harm from drinking, which can include stopping drinking; accepting counseling, medications, or participation in a support group; reducing drinking; counting drinks; not using other substances when drinking; substituting less intoxicating beverages; drinking on a full stomach; drinking in safer environments; getting regular health care. The patient may choose not to change their drinking.

Below is a four-step model of performing a brief intervention. More info at www.sbirthoregon.org

Raise the subject

- “Thanks for filling out this form – is it okay if we briefly talk about your alcohol use?”
- “Just so you know, my role is to help you assess the risks so you can make your own decisions. I want to help you improve your quality of life on your own timeline.”
- “What can you tell me about your alcohol use?”

Share information

- Explain any association between the patient’s use and their health complaint, then ask, “Do you think your use has anything to do with your [anxiety, insomnia, STD, etc.]?”
- Share information about alcohol use disorder.
- Ask the patient: “What do you think of this information?”

Enhance motivation

- Ask patient about perceived pros and cons of their use, then summarize what you hear.
- Elicit a goal: “Where do you want to go from here? What’s your goal, or vision?”
- Gauge patient’s readiness/confidence to reach their goal. If using Readiness Ruler: “Why do did you pick that number on a scale of 0-10 instead of ____ [lower number]?”

Identify plan

- If patient is ready, ask: “What steps do you think you can take to reach your goal?”
- Affirm the patient’s readiness/confidence to meet their goal and affirm their plan.
- “Can we schedule an appointment to check in and see how your plan is going? You may want to change your goal or make a new plan.”