

استبيان فحص المخدرات (Arabic - DAST)

يمكن أن يؤثر تعاطي المخدرات على صحتك وبعض الأدوية التي قد تتناولها. يرجى مساعدتنا في تزويدك بأفضل رعاية طبية من خلال الإجابة على الأسئلة أدناه.

- ☐ الميثامفيتامين (السرعة ، الكريستال) ☐ كوكايين
☐ القنب (الماريجوانا ، وعاء) ☐ المخدرات (الهيروين ، الأوكسيكودون ، الميثادون ، إلخ)
☐ المستنشقات (مخفف الطلاء ، الهباء الجوي ، الغراء) ☐ المهلوسات (LSD ، الفطر)
☐ المهدئات (الفاليوم) ☐ آخر

كم مرة استخدمت هذه الأدوية؟ ☐ شهريا أو أقل ☐ أسبوعيا يوميا أو شبه يومي

1. هل استخدمت أدوية أخرى غير تلك المطلوبة لأسباب طبية؟	لا	نعم
2. هل تتعاطى أكثر من مخدر في وقت واحد؟	لا	نعم
3. هل أنت قادر دائما على التوقف عن تعاطي المخدرات عندما تريد ذلك؟	لا	نعم
4. هل سبق لك أن عانيت من حالات إغماء أو ذكريات الماضي نتيجة لتعاطي المخدرات؟	لا	نعم
5. هل شعرت يوما بالسوء أو الذنب حيال تعاطيك للمخدرات؟	لا	نعم
6. هل يشكو زوجك (أو والدك) من تورطك في المخدرات؟	لا	نعم
7. هل أهملت عائلتك بسبب تعاطيك للمخدرات؟	لا	نعم
8. هل شاركت في أنشطة غير قانونية من أجل الحصول على المخدرات؟	لا	نعم
9. هل سبق لك أن عانيت من أعراض الانسحاب (شعرت بالغثيان) عندما توقفت عن تعاطي المخدرات؟	لا	نعم
10. هل عانيت من مشاكل طبية نتيجة تعاطي المخدرات (مثل فقدان الذاكرة والتهاب الكبد والتشنجات والنزيف)؟	لا	نعم

هل سبق لك أن تناولت المخدرات عن طريق الحقن؟ ☐ نعم أبدا ☐ ، في ال 90 يوما الماضية ☐ نعم ، منذ أكثر من 90 يوما

هل سبق لك أن خضعت للعلاج من تعاطي المخدرات؟ ☐ أبدا ☐ حاليا ☐ في past

I II III IV
0 1-2 3-5 6+

(For the health professional)

Scoring and interpreting the DAST:

“Yes” responses receive one point each, **except for question #3, which receives one point for a “No” answer.** Points are added for a total score, which correlates with a zone of use that can be circled on the bottom right corner of the first page.

Score	Zone of use	Indicated action
0	I – No risk No risk of related health problems	None
1 - 2 , plus the following criteria: No daily use of any substance; no weekly use of drugs other than cannabis; no injection drug use in the past 3 months; not currently in treatment.	II – Risky Risk of health problems related to drug use.	Offer brief education on the benefits of abstaining from drug use. Monitor at future visits.
1 - 2 (without meeting criteria)		Brief intervention
3 - 5	III – Harmful Risk of health problems related to drug use and a possible mild or moderate substance use disorder.	Brief intervention (offer options that include treatment)
6+	IV – Severe Risk of health problems related to drug use and a possible moderate or severe substance use disorder.	

Brief education: Inform patients about low-risk consumption levels and the risks of excessive alcohol use.

Brief intervention: Patient-centered discussion that employs Motivational Interviewing concepts to raise an patient’s awareness of their substance use and enhances their motivation to change their use. Brief interventions are typically performed in 3-15 minutes, and should occur in the same session as the initial screening. Repeated sessions are more effective than a one-time intervention.

If a patient is ready to accept treatment, a referral is a proactive process that facilitates access to specialized care for individuals likely experiencing a substance use disorder. These patients are referred to alcohol and drug treatment experts for more definitive, in-depth assessment and, if warranted, treatment. However, treatment also includes prescribing medications for substance use disorder as part of the patient’s normal primary care.

More resources: www.sbirtoregon.org