استبيان اضطراب القلق العام (GAD-7 - Arabic)

| تسأل الأسئلة أدناه عن عدد المرات ومدى شدة أعراض القلق خلال الأسبوعين | |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| الماضيين. يرجى مساعدتنا في تزويدك بأفضل رعاية طبية من خلال الإجابة على | |
| الأسئلة التالية. | |

| | | | | أكثر من | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|--|
| ية؟ | على مدار الأسبوعين الماضيين ، كم مرة أز عجتك المشاكل التال | عفوًا | عدة أيام | نصف الأيام | كل يوم تقريبا | |
| .1 | الشعور بالتوتر أو القلق أو الحذر | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .2 | عدم القدرة على التوقف أو التحكم في القلق | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .3 | القلق كثيرا بشأن الأشياء المختلفة | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .4 | صعوبة في الاسترخاء | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .5 | كونك مضطربا لدرجة أنه من الصعب الجلوس ساكنا | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .6 | أن تصبح منز عجا أو متهيجا بسهولة | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .7 | الشعور بالخوف كما لو أن شيئا فظيعا قد يحدث | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| الدرجة الإجمالية لجميع إجاباتك: | | | | | | |
| ي | إذا قمت بفحص أي مشاكل ، فما مدى صعوبة هذه المشاكل التو جعلت عليك القيام بعملك ، والاهتمام بالأشياء في المنزل ، أو التعايش مع أشخاص آخرين؟ | ليس صعبا على الإطلاق | صعب إلى حد ما | صعب جدا | صعب للغاية | |

| | ىتى بدأت الأعراض؟ |
|--|-------------------|
| | |
| | |
| | |

For the clinician:

Scoring and Interpretation:

| 1 – 4 points | 5 - 9 points | 10 – 14 points | 15 – 21 points |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimal anxiety | Mild anxiety | Moderate anxiety | Moderate to severe anxiety |
| Treatment for anxiety may not be clinically indicated. | Therapist uses clinical judgement about treatment needs based upon knowledge of the client, duration and severity of symptoms | Treatment goals and interventions target the specific symptoms indicated by client's answers. | Treatment goals and interventions target the specific symptoms indicated by client's answers. This score often warrants treatment using medication, therapy, or both. |

References:

- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine. May 22 2006;166(10):1092-1097. PMID: 16717171
- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, Monahan PO, Lowe B. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Annals of internal medicine. Mar 6 2007;146(5):317-325. PMID: 17339617
- Lowe B, Decker O, Muller S, et al. Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Medical care. Mar 2008;46(3):266-274. PMID: 18388841